

FOGLIO ILLUSTRATIVO

# **fitostimoline® 15% garze impregnate estratto acquoso di Triticum vulgare**

---

## **Categoria farmacoterapeutica**

Cicatrizante

## **Indicazioni terapeutiche**

**fitostimoline® 15% garze impregnate** è indicato per il trattamento delle ulcere e piaghe da decubito.

## **Controindicazioni**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

## **Precauzioni per l'uso**

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifichi, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea. Altrettanto dicasi in caso di sviluppo di germi insensibili.

## **Interazioni**

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. Non sono note interazioni od incompatibilità.

## **Avvertenze speciali**

### ***Gravidanza ed Allattamento***

**fitostimoline® 15% garze impregnate** può essere impiegato senza inconvenienti in corso di gravidanza e di allattamento.

### ***Effetti sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari***

**fitostimoline® 15% garze impregnate** non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso delle macchine.

## **Dose, modo e tempo di somministrazione**

Il trattamento va da una a due applicazioni al giorno avendo cura che la medicazione resti sempre umida, morbida e plastica.

Modalità di applicazione (vedere le istruzioni allegate):

Aprire una busta, rimuovere il film plastico protettivo, prelevare la garza ed applicarla direttamente sulla parte preventivamente detersa e disinfettata. Ricoprire con garza sterile e quindi con cotone idrofilo (quando trattasi di piaghe molto secernenti).

Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con sola acqua sterile, in quanto la crema è completamente idrodispersibile e non lascia residui.

### **Sovradosaggio**

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di fitostimoline, rivolgersi al medico o al farmacista.

### **Effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, fitostimoline può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Non sono stati segnalati effetti indesiderati. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

### **Scadenza e conservazione**

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare il prodotto a temperatura non superiore a 30° C. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI**

### **Composizione**

Ogni garza è impregnata a saturazione con 4 grammi di crema dalla seguente composizione (per 100 grammi):

**Principio attivo:** estratto acquoso di *Triticum vulgare* (residuo secco pari a mg 200/100 ml) g 15.

**Eccipienti:** 2-fenossietanolo; macrogol 400; macrogol 600; macrogol 1500; macrogol 4000; glicerina; acqua depurata.

**Forma farmaceutica e contenuto**

10 garze impregnate cm 10 x 10, a buste singole: ogni busta è in carta/alluminio/polietilene e contiene una garza impregnata cm 10 x 10 racchiusa in un film di materiale plastico polipropilene/polietilene.

**Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore**

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A.  
Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.


**Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco**

Determinazione del 12/10/2010


® nome depositato

## ISTRUZIONI PER L'USO E L'APPLICAZIONE DELLE GARZE


- 1** Aprire la busta



- 2** Rimuovere il film  
plastico protettivo



- 3** Prelevare la garza



- 4** Applicare la garza

