

OKi®

1,6% collutorio

Ketoprofene sale di lisina

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

OKi 1,6% collutorio
ketoprofene sale di lisina

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Antiinfiammatorio non steroideo, appartenente alla classe dei derivati dell'acido propionico.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo oro-faringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità individuale accertata verso il farmaco o nei soggetti nei quali l'impiego di altri farmaci antiinfiammatori non steroidei abbia determinato reazioni allergiche come asma, orticaria o rinite.

PRECAUZIONI PER L'USO

Nelle terapie prolungate e con alte dosi si tenga presente la possibilità di competizione tra ketoprofene assorbito e altri farmaci ad alto legame con le proteine plasmatiche.

Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo oro-faringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

INTERAZIONI

Allo stato attuale non sono emerse interazioni negative con altri farmaci.

AVVERTENZE SPECIALI

L'uso specie se prolungato di farmaci topici potrebbe dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione, nel qual caso occorre sospendere la cura e adottare idonee misure terapeutiche.

Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

Gravidanza e allattamento

Come gli altri farmaci antiinfiammatori non steroidei, OKi 1,6% collutorio (ketoprofene sale di lisina) non deve essere utilizzato in caso di gravidanza accertata o presunta e durante l'allattamento al seno.

Effetti sulla capacità di guidare ed usare macchinari

Non sono noti effetti sul grado di attenzione



Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Nella confezione è annesso un misurino dosatore con una tacca corrispondente a 10 ml.

Per aprire la confezione è necessario premere con forza il tappo e ruotare contemporaneamente in senso antiorario.

Due sciacqui o gargarismi al giorno con 10 ml di OKi 1,6% collutorio diluito in circa 100 ml di acqua.

L'eventuale deglutizione involontaria di soluzione impiegata per sciacqui e gargarismi non comporta alcun particolare danno per il paziente in quanto equivale alla dose prevista per via sistemica.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono stati segnalati effetti collaterali locali o sistemici dovuti all'impiego della soluzione contenente ketoprofene sale di lisina. Nel caso si manifestino effetti indesiderati, consultare il medico curante.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE

COMPOSIZIONE

100 ml di collutorio contengono come principio attivo: Ketoprofene sale di lisina 1,6 grammi; Eccipienti: Glicerina, Alcool etilico, Metile p-idrossibenzoato, Aroma menta, Mentolo, Saccarina sodica, Colorante Verde Certosa, Sodio fosfato monobasico, acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Collutorio in flacone da 150 ml

TITOLARE AIC

Dompé s.p.a.

Via Campo di Pile - L'Aquila

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE:

Alfa Wassermann s.p.a. - Via Enrico Fermi, 1 - Alanno (PE)

oppure

Alfa Wassermann s.p.a. - Via Enrico Fermi, 1 - Alanno (PE) con confezionamento secondario e controlli terminali presso Dompé s.p.a. - Via Campo di Pile - L'Aquila

oppure

Montefarmaco s.p.a. Via G. Galilei 7, Pero (MI)

oppure

Montefarmaco s.p.a. Via G. Galilei 7, Pero (MI) con confezionamento secondario e controlli terminali presso Dompé s.p.a. - Via Campo di Pile - L'Aquila

oppure

Dompé s.p.a. - Via Campo di Pile - L'Aquila

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:

Dicembre 2009